Instrucciones

1. Muerda la gaza por trenta minutos, no mastique.
2. Podrá sangrar un poco por 24 horas.
3. No fume, no escupa, no use un pajilla.
4. Aplique hielo en la cara para ayudar a sentirse mejor.
5. Tome 1 acetaminofén cada 4 horas contra dolor cuando se necesita.
6. Tome solo cosas frías por 24 horas.
7. Regrese si el dolor empeora.

Instrucciones

1. Muerda la gaza por trenta minutos, no mastique.
2. Podrá sangrar un poco por 24 horas.
3. No fume, no escupa, no use un pajilla.
4. Aplique hielo en la cara para ayudar a sentirse mejor.
5. Tome 1 acetaminofén cada 4 horas contra dolor cuando se necesita.
6. Tome solo cosas frías por 24 horas.
7. Regrese si el dolor empeora.

Instrucciones

1. Muerda la gaza por trenta minutos, no mastique.
2. Podrá sangrar un poco por 24 horas.
3. No fume, no escupa, no use un pajilla.
4. Aplique hielo en la cara para ayudar a sentirse mejor.
5. Tome 1 acetaminofén cada 4 horas contra dolor cuando se necesita.
6. Tome solo cosas frías por 24 horas.
7. Regrese si el dolor empeora.

Instrucciones

1. Muerda la gaza por trenta minutos, no mastique.
2. Podrá sangrar un poco por 24 horas.
3. No fume, no escupa, no use un pajilla.
4. Aplique hielo en la cara para ayudar a sentirse mejor.
5. Tome 1 acetaminofén cada 4 horas contra dolor cuando se necesita.
6. Tome solo cosas frías por 24 horas.
7. Regrese si el dolor empeora.

Instrucciones

1. Muerda la gaza por trenta minutos, no mastique.
2. Podrá sangrar un poco por 24 horas.
3. No fume, no escupa, no use un pajilla.
4. Aplique hielo en la cara para ayudar a sentirse mejor.
5. Tome 1 acetaminofén cada 4 horas contra dolor cuando se necesita.
6. Tome solo cosas frías por 24 horas.
7. Regrese si el dolor empeora.

Instrucciones

1. Muerda la gaza por trenta minutos, no mastique.
2. Podrá sangrar un poco por 24 horas.
3. No fume, no escupa, no use un pajilla.
4. Aplique hielo en la cara para ayudar a sentirse mejor.
5. Tome 1 acetaminofén cada 4 horas contra dolor cuando se necesita.
6. Tome solo cosas frías por 24 horas.
7. Regrese si el dolor empeora.

Instrucciones

1. Muerda la gaza por trenta minutos, no mastique.
2. Podrá sangrar un poco por 24 horas.
3. No fume, no escupa, no use un pajilla.
4. Aplique hielo en la cara para ayudar a sentirse mejor.
5. Tome 1 acetaminofén cada 4 horas contra dolor cuando se necesita.
6. Tome solo cosas frías por 24 horas.
7. Regrese si el dolor empeora.

Instrucciones

1. Muerda la gaza por trenta minutos, no mastique.
2. Podrá sangrar un poco por 24 horas.
3. No fume, no escupa, no use un pajilla.
4. Aplique hielo en la cara para ayudar a sentirse mejor.
5. Tome 1 acetaminofén cada 4 horas contra dolor cuando se necesita.
6. Tome solo cosas frías por 24 horas.
7. Regrese si el dolor empeora.

Instrucciones

1. Muerda la gaza por trenta minutos, no mastique.
2. Podrá sangrar un poco por 24 horas.
3. No fume, no escupa, no use un pajilla.
4. Aplique hielo en la cara para ayudar a sentirse mejor.
5. Tome 1 acetaminofén cada 4 horas contra dolor cuando se necesita.
6. Tome solo cosas frías por 24 horas.
7. Regrese si el dolor empeora.

Instrucciones

1. Muerda la gaza por trenta minutos, no mastique.
2. Podrá sangrar un poco por 24 horas.
3. No fume, no escupa, no use un pajilla.
4. Aplique hielo en la cara para ayudar a sentirse mejor.
5. Tome 1 acetaminofén cada 4 horas contra dolor cuando se necesita.
6. Tome solo cosas frías por 24 horas.
7. Regrese si el dolor empeora.

Instrucciones

1. Muerda la gaza por trenta minutos, no mastique.
2. Podrá sangrar un poco por 24 horas.
3. No fume, no escupa, no use un pajilla.
4. Aplique hielo en la cara para ayudar a sentirse mejor.
5. Tome 1 acetaminofén cada 4 horas contra dolor cuando se necesita.
6. Tome solo cosas frías por 24 horas.
7. Regrese si el dolor empeora.